

# Памятка населению по профилактике ящура

С 5 октября 2017г. в Башкирии установлен карантин по ящуру.



**Возбудитель ящура** – вирус, не устойчивый к высоким температурам. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура, повышенная влажность и нейтральная среда объектов.

Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в случае заражения вирусом другого типа. Источник болезни – больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями.



Вирус ящура устойчив во внешней среде. Переболевшие животные являются вирусоносителями более 400 дней и являются потенциальным источником инфекции.

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязнённые выделениями больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.

**Важно!!!** Человек заражается при употреблении не обезвреженного молока от больных животных.

Клинические признаки ящура – высокая температура до 41 градуса, у животных наблюдается состояние прострации, учащение пульса, покраснение слизистой оболочки ротовой полости и конъюнктивы, уменьшение выделения молока, сухость

носового зеркала, отёчность венчика копыт. Животное стонет, у него начинается обильное слюнотечение, возникает жажда, хромота. Затем в полости рта, на языке появляются болезненные поражения круглой или продолговатой формы. Большие поражения размером с грецкий орех бывают на носовом зеркале и межкопытной щели. Вымя отекает, становится болезненным. Поражение носоглотки и слизистой оболочки трахеи затрудняют дыхание и глотание. Вирус ящура может вызвать у беременных животных аборт, рождение мёртвых или слабых плодов.

Во исполнение ветеринарно-санитарных правил по борьбе с особо опасными заболеваниями, в целях профилактики заболевания сельскохозяйственных животных ящуром на территории владельцам животных необходимо:

-не допускать ввоз (вывоз), передвижение, покупку, продажу животных и кормов без разрешения Управления ветеринарии Минсельхоза по Челябинской области.

-не допускать убоя животных и использования мяса и мясопродуктов без проведения предубойного ветеринарного осмотра и ветеринарной экспертизы.

-по первому требованию государственных ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров и иммунизации.

-выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению ветеринарно-санитарных правил по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных.

-о каждом случае заболевания животных, независимо от установленного диагноза, падежа животных, сообщить в ОГБУ «Челябинская ветстанция по борьбе с болезнями животных».



**По всем вопросам необходимо обращаться к ветеринарным специалистам ОГБУ "Челябинская ветстанция" по единому тел. 214-14-14 или по адресам: г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 18 а; Пржевальского, 2; Марченко, 7 в**  
Часы работы ежедневно с 8.30 до 20.00  
[www.ветлечебница74.рф](http://www.ветлечебница74.рф)